

# Encuesta de tabaquismo en personal de enfermería en dos hospitales especializados en patología respiratoria: Existen diferencias entre ambos grupos?

**Autores:** Juan Schottlander <sup>1</sup>, Silvia Rey <sup>2</sup>, Omar Sanchez <sup>1</sup>, Juan Manuel Luchelli <sup>1</sup>, Eugenia Vetrivano <sup>1</sup>, Dora Lombardi <sup>1</sup>, Marta Cortiñaz <sup>2</sup>, Rubén Glosso <sup>2</sup>, Salvador Pace <sup>2</sup>, Marina Tajés <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Hospital María Ferrer. Ciudad de Buenos Aires – Argentina

<sup>2</sup> Hospital Antonio Cetrángolo. Vicente López, Provincia de Buenos Aires - Argentina

**Objetivo:** Conocer la prevalencia de tabaquismo en el personal de enfermería en dos instituciones especializadas en patología respiratoria, sus opiniones con respecto al tabaquismo y evaluar si existen diferencias entre ambos grupos.

**Materiales y método:** Se realizó una encuesta sobre tabaquismo al personal de enfermería de dos hospitales especializados en patología respiratoria con un formulario que es una versión de la encuesta validada para estudiantes de enfermería. Se propuso responder a la encuesta a todo el personal de enfermería de ambos hospitales. La participación fue voluntaria, anónima y la respuesta al cuestionario fue autoadministrada. La recolección de datos fue realizada durante los meses de diciembre de 2012 y enero del 2013. Se realizó medición de CO esp a todos los participantes.

- **No fumador (NF):** fumó menos que 100 cigarrillos, 20 pipas o 20 cigarros en toda su vida.
- **Ex fumador (EF):** último cigarrillo fumado hace más de 6 meses al momento de la encuesta.
- **Fumador activo (FA):** aquel que continúa fumando en forma diaria al momento de la encuesta.
- **Fumador ocasional (FO):** fuma en forma intermitente.

Los resultados se expresan en media  $\pm$  desvío estándar ( $x \pm DS$ ) y porcentajes.


Para la comparación de porcentajes se utilizó chi cuadrado y la comparación de grupos se utilizó test de T. Se consideró significativa una  $p < 0,05$ .

## Resultados

	Cetrángolo	Ferrer	p
N° enfermeros	65	120	
Encuestas completas	44 (70%)	42,7 (74%)	NS
Edad (años)	41,7 $\pm$ 8,8	42,7 $\pm$ 11,1	NS
Sexo femenino	33 (75%)	61 (69%)	NS

El porcentaje de enfermeros que aceptaron participar en la encuesta fue similar en ambos hospitales. Hubo predominancia de sexo femenino en ambos grupos y la distribución etérea fue similar.

## Distribución del tabaquismo



No hubo diferencias en la proporción de enfermeros que habían probado fumar (84 vs 70%). Más de la mitad de los encuestados de ambos grupos cumplían criterios de fumadores y alrededor de una cuarta parte continuaban fumando actualmente.

## Qué es el tabaquismo?



El CO esp. Fue similar en ambos grupos (Cetrángolo  $8,14 \pm 9,51$ , Ferrer  $6,66 \pm 8,48$ , NS)

	Cetrángolo	Ferrer	p
Tabaquismo pasivo perjudicial	44 (100%)	89 (100%)	NS
Información en estudios	34 (77%)	66 (74%)	NS
Desea información	42 (95%)	80 (90%)	NS

## Conclusiones:

- No se hallaron diferencias significativas en las características generales del grupo y en la prevalencia del tabaquismo entre los dos grupos.
- Llama la atención que la prevalencia de tabaquismo activo es levemente inferior a la informada en la población general a pesar de un medio laboral en el que se manejan patologías relacionadas al humo de cigarrillo.
- Aunque en ambos grupos la proporción de encuestados que pensaba que el tabaquismo es sólo un hábito fue similar, los enfermeros del Ferrer pensaban en su mayoría que el tabaquismo era una adicción, mientras que los del Cetrángolo lo relacionaban a tanto a una conducta adictiva como a un hábito.
- Si bien no hubo diferencias entre los grupos con respecto a lo que opinaban sobre la información en tabaquismo es evidente la necesidad de formación sobre el tema, ya que muchos no la habían recibido durante sus estudios, un número importante no relacionaba al tabaquismo con la adicción y casi todos los encuestados deseaban recibirla.